


از این که برای سالم و ایمن نگاه داشتن خود، خانواده و جامعه‌تان واکسن کووید-19 را دریافت کردید، از شما سپاسگزاریم.



2 هفته بعد از دریافت دوز نهایی واکسن کووید-19، در برابر این ویروس ایمن یا محافظت‌شده تلقی می‌شوید. با این حال، اگر قبل از این که فرصت دریافت دوز آخر واکسن را پیدا کنید، یا قبل از این که بدنتان به طور کامل ایمنی ایجاد کند، در معرض ویروس قرار گرفتید، باز هم ممکن است بیمار شوید.

تا زمانی که افراد بیشتری امکان واکسیناسیون را پیدا کنند، همچنان باید ماسک بزنید و اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کووید-19 انجام دهید.

همه واکسن‌های کووید-19 که تاییدیه FDA را دارند، ایمن و در محافظت از شما در برابر ویروس موثر هستند. آنها از شما در برابر بیمار شدن، نیاز به بستری شدن و مرگ بابت کووید-19 محافظت می‌کنند. مطالعات اخیر¹ نشان می‌دهد که واکسن‌ها می‌توانند از انتقال ویروس به سایر افراد جلوگیری کنند و علیه گونه‌های جدید ویروس که تا کنون شناسایی شده‌اند، عمل می‌کنند.



تا زمانی که متخصصین حوزه پزشکی در شرایط زندگی واقعی بفهمند که هنوز هم می‌توانید پس از واکسینه شدن، ویروس را به دیگران منتقل کنید یا خیر، مهم است که همچنان از همه ابزارهای موجود برای توقف همه‌گیری استفاده کنیم: هر وقت که در نزدیکی افرادی هستید که با شما زندگی نمی‌کنند ماسک بزنید، فاصله 6 فوتی (2 متری) خود با دیگران را حفظ کنید، به طور مرتب دستهای خود را بشوید و وقتی بیمار هستید، در خانه بمانید. **با واکسیناسیون بیشتر افراد، زندگی می‌تواند به حالت عادی خود برگردد.**



گونه‌های کووید-19

گونه‌های آینده کووید-19 (که گاهی سویه نامیده می‌شوند) ممکن است از گونه‌های قبلی کووید-19 شدت سرایت بیشتری داشته باشند. بنابراین اکنون بیشتر از همیشه، ساکنین یوتا باید ماسک بزنند، فاصله اجتماعی را رعایت کنند و از گردهمایی‌های بزرگ دوری کنند.

¹ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html>

واکسیناسیون کووید-19 چه تاثیری بر دستورالعمل‌های قرنطینه و جداسازی دارد؟

اگر بیش از 2 هفته از تزریق آخرین دوز واکسن می‌گذرد، مجبور نیستید خود را قرنطینه کنید، حتی اگر در کنار کسی قرار بگیرید که جواب آزمایش وی مثبت شده باشد. با این حال، حتی در صورت دریافت واکسن کووید-19، در برخی شرایط شاید لازم باشد خود را قرنطینه کنید.

در صورت مشاهده علائم کووید-19 چه باید کرد:

اگر علائم کووید-19 را دارید و:	
هنوز واکسینه نشده‌اید	کامل واکسینه نشده‌اید (فقط 1 دوز از یک واکسن 2 دوزه، مثل فایزر و مدرنا را دریافت کرده‌اید)
خود را قرنطینه کنید و فوراً تست دهید .	خود را قرنطینه کنید و فوراً تست دهید .

اگر کامل واکسینه شده‌اید و دارای علائم کووید-19 هستید: (هر 2 دوز واکسن فایزر یا مدرنا یا 1 دوز واکسن جانسون و جانسون را دریافت کرده‌اید)	
اگر هنوز 2 هفته از زمان واکسیناسیون‌تان نگذشته باشد	اگر حداقل 2 هفته از زمان واکسیناسیون‌تان گذشته باشد
خود را قرنطینه کنید و فوراً تست دهید .	خود را قرنطینه کنید و با پزشک خود یا ارائه‌دهنده خدمات درمانی مراقبتی خود تماس بگیرید. این احتمال وجود دارد که چیزی غیر از کووید-19 باعث بروز این علائم در شما شده باشد. با این حال، ممکن است پزشک‌تان از شما بخواهد که تست کووید-19 را انجام دهید. واکسن‌های کووید-19 تداخلی در صحت آزمایش ندارند.

در صورت قرار گرفتن در معرض کسی که آزمایش وی مثبت شده است، باید چه اقدامی کرد:

چنانچه دوز آخر واکسن را دریافت نکرده‌اید و در معرض کسی قرار گرفته‌اید که آزمایش وی مثبت شده است:	
هنوز واکسینه نشده‌اید	کامل واکسینه نشده‌اید (فقط 1 دوز از یک واکسن 2 دوزه، مثل فایزر و مدرنا را دریافت کرده‌اید)
خود را قرنطینه کنید و تست کووید-19 را انجام دهید.	خود را قرنطینه کنید و تست کووید-19 را انجام دهید.

چنانچه دوز آخر واکسن را دریافت کرده‌اید و در معرض کسی قرار گرفته‌اید که آزمایش وی مثبت شده است: (هر 2 دوز واکسن فایزر یا مدرنا یا 1 دوز واکسن جانسون و جانسون را دریافت کرده‌اید)	
اگر هنوز 2 هفته از زمان واکسیناسیون‌تان نگذشته باشد	اگر حداقل 2 هفته از زمان واکسیناسیون‌تان گذشته باشد
خود را قرنطینه کنید و تست کووید-19 را انجام دهید.	نیازی نیست خود را قرنطینه کنید. با این حال، چنانچه پس از قرارگیری در معرض فرد مبتلا، علائم کووید-19 را در خود مشاهده کردید (که امری نادر است)، با پزشک یا ارائه‌دهنده خدمات درمانی مراقبتی خود تماس بگیرید. شما باید تست کووید-19 بدهید.

